


VOGELS



ZOEKKAART VOGELS

1. Huismus

Dit is een stadsvogel bij uitstek en gebonden aan menselijke nederzettingen. De vogel zoekt ook de drukte van menselijke activiteiten op. Mussen zoeken gezamenlijk voedsel en hebben een druk sociaal gedrag. Typerend is het nemen van stofbaden tegen allerlei huidparasieten. Ze broeden onder dakpannen, in gaten in muren e.d. Ze kunnen 2-3 legfels per jaar hebben met 4-5 witte tot lichtgroene eieren. De broedduur is 2 weken.

2. Spreeuw

Spreeuwen vallen vaak op, doordat ze met grote groepen door de stad trekken en in slaapbomen met veel vogels overnachten. Met de lange snavel eet de spreeuw wormen, bessen en andere zaken, maar ook afval. Ze nestelen in boomholten, nestkasten, onder pannen etc. Het mannetje lokt het vrouwtje door aanstellerige zang en het trillen met de vleugels. Het legfel bestaat uit 5-6 blauwgroene eieren, waar 2 weken op wordt gebroed. In maart trekken veel spreeuwen naar Noord Europa en in oktober terug naar midden Europa.

3. Merel

De merel is oorspronkelijk een vrij schuwe bosvogel, die nu in parken en tuinen voorkomt en zelfs in de dichte nabijheid van de mens nestelt. Ze leven hoofdzakelijk van wormen en insecten, die onder de afgevallen bladeren te vinden zijn. De opvallende zang is vooral in maart en april te horen. Het vrouwtje broedt van maart tot in juli op een groot gevlochten nest. De broedduur is 2 weken en er zijn twee legfels per jaar van 3-5 eieren. Opvallend is de slaande alarmroep.

4. Roodborst

De roodborst is tegenover soortgenoten erg onverdraagzaam, maar laat zich door de mens zeer dicht benaderen. De vogel is nogal nieuwsgierig. Zowel het mannetje als vrouwtje zingen tot in de

winter een hoog helder liedje. De broedtijd is van maart tot juni. Het nest is klein en verborgen in boomspleten, struiken, klimplanten, in nestkasten of op de grond. Het vrouwtje broedt twee weken op de 4-6 witte eieren met roodbruine vlekjes.

5. Koolmees

Het is een bekende opvallende vogel uit vrijwel al onze parken en bossen. Ze trekken veel rond en leven hoofdzakelijk van insecten. In de winterperiode zijn ze vaak op de voedertafels en -plaatsen te zien en eten dan ook vethoudende zaden zoals pinda's. Ze komen dan ook op de hand. Zeker op plaatsen waar vaak gevoerd wordt. Ze broeden voornamelijk in nestkasten. Ze hebben 2 legfels per jaar van 6-12 rood-bruine eieren. Ze hebben verschillende geluiden, waarvan het zagen het meest bekend is.

6. Pimpelmees

Dit is het kleinste meesje van ons land en erg levendig en acrobatisch. Ze zijn goed te herkennen aan de blauwe kleuren op de kop. Evenals de koolmees is het een holenbroeder (nestkast) en ze gebruiken allerlei kleine holletjes om 2 keer per jaar 7-12 jongen groot te brengen. In de parken hebben ze veel concurrentie als het gaat om nestgelegenheid.

7. Vink

Vinken vormen in hun broedgebied groepjes waarin het territorium en paringsgedrag sterk geprogrammeerd is. De zang is een stereotyp liedje (vinkenslag) vanaf een hoge zitplaats. Het gezichtsvermogen bij vinken is erg belangrijk. Ze bezoeken in kleine groepjes voederplaatsen waar onkruid-, distelzaden en ook wel beukenootjes te vinden zijn. De broedtijd is van april tot juni. Het vrouwtje broedt twee weken in struiken en klimplanten ongeveer 3 meter boven de grond op de 5-6 lichtblauwe eieren met roodbruine vlekjes.

8. Houtduif

De houtduif is een sierlijke stadsvogel, die echter veel schade veroorzaakt aan zaaigoed en kiemplanten in de open tuin- en akkerbouw. In de stad veroorzaken ze overlast door vervuiling van gebouwen en auto's. Daarnaast brengen ze ook wel ziektes over.

Ze broeden van april tot oktober; hebben meerdere legfels per jaar van 2-3 witte eieren. De nesten zijn vaak slordige (maar stevige) bouwsels in de straatbomen.

9. Turkse Tortelduif

Deze vogel heeft zich de laatste tientallen jaren over geheel Europa verspreid. Ze kwamen uit de Balkan en nog eerder uit India. Ze zwerven vaak rond in de parken op zoek naar graan en in de broedtijd naar nestgelegenheid. Daarbij verjagen ze zelfs houtduiven. Zowel het mannetje als het vrouwtje broeden. De broedtijd is van maart tot oktober en ze hebben dan ook wel 4-5 legfels met 2-3 eieren per keer. De eieren komen na ongeveer 3 weken uit.

10. Kauw

Deze vogel leeft in groepen waarbinnen door roepen onderling contact wordt onderhouden. Ze broeden in schoorstenen en in de parken in boomholten. Het is o.a. dank zij Lorenz bekend, dat de paartjes levenslang bij elkaar blijven. De broedtijd is van april tot juni. Ze leggen 4-6 grijsblauwe gespikkelde eieren.

11. Ekster

Eksters komen de laatste jaren steeds meer in de stad voor. Ze vallen op door de zwart-witte kleuren en de lange staart. Als alle kraaiachtigen is de ekster een alleseter en versmaadt hij in het voorjaar ook jonge vogels niet. Hij broedt in grote bolvormige nesten, die hoog in de bomen worden gemaakt. De broedtijd is april-mei. Het vrouwtje legt 4-7 bleek-blauw-groene eieren met vlekken. De eieren komen 17-18 dagen uit. Alleen het vrouwtje broedt.

12. Kapmeeuw

Kapmeuwen zoeken in de winter de omgeving van de stad op om daar voedsel te zoeken. Ze leven dan ook voor een deel van het afval van de mensen. De jongen trekken in juni al weg, terwijl de volwassen vogels hier overwinteren. In de zomer is de kleur van de kop zwart-bruin. In de winter is deze wit met een paar „oorwarmers”. Mannetje en vrouwtje broeden 3-4 weken op 3 blauwgroene of zandgrijze eieren met zwarte of bruine vlekken. De jonge vogels gaan al spoedig na het uitkomen op zoek naar voedsel en verlaten daarvoor het nest (nestvlieders).

13. Wilde eend

Dit is de meest algemene en verspreide eend van onze streken. Er zijn veel kruisingen tussen sierende en bastaardeenden. De wilde eend is het gehele jaar door te zien. Alleen de vrouwtjes broeden 4 weken op de 8-10 groenige eieren en bewaakt de rondzwemmende jongen, die naar hun eigen voedsel zoeken (nestvlieders).

14. Knobbelzwaan

Er zijn zowel tamme, halfverwilderde als wilde knobbelzwanen. In de stad zijn het tamme of halfverwilderde. Buiten de stad zijn het meestal wilde knobbelzwanen. Ze eten waterplanten en kleine dieren. De snavelrand is gekarteld om het voedsel te kunnen zeven en vast te houden. Het zwijgzame sierlijke mannetje bewaakt zijn broedgebied door te pronken en te dreigen. Zowel het mannetje als het vrouwtje broeden 5 weken op de 5-7 grijsgroene eieren. De jongen zijn het eerste jaar bruinachtig gekleurd.

15. Meerkoet

De meerkoet is een veel voorkomende zwarte watervogel met witte snavel en bles. Hij eet vrijwel alles en kan eenden nog wel eens concurreren in het bemachtigen van voedsel dat door de mens geboden wordt. Bij strenge vorst sterven veel meerkoeten, doordat de gelobde zwemvoeten kunnen bevriezen. Er kunnen twee legfels voortgebracht worden van 6-12 vuilwitte eieren met donkere stippen en vlekken. Het vrouwtje broedt in ongeveer 3 weken de eieren uit en de jonge koetjes (met een rood kopje) verlaten al gauw het nest om voedsel te gaan zoeken. De meerkoet is een uitstekend duiker.

16. Blauwe reiger

Dit is de meest voorkomende Europese reiger, die fourageert langs meren, kusten, rivieren en polders. Ze broeden in kolonies in hoge bomen, die meestal na verloop van jaren afsterven door de scherpe mest. Tijdens de vlucht heeft de reiger zijn hals ingetrokken. Veel reigers overwinteren hier en bij strenge vorst sterven er dan ook veel door de kou en het voedselgebrek. De broedtijd is februari-juni. Het mannetje en vrouwtje broeden 4 weken op de 4-5 blauwgroene eieren.



Dienst
Groenvoorzieningen en
Milieueducatie